

Classe(s) :

Date : / /

REINVESTISSEMENT en vue de la Terminale S

Matière

MATHEMATIQUES

Durée de l'épreuve :

Professeur

Nombre de page(s) : __ / __

Document(s) autorisé(s)

Calculatrice autorisée


Exercice 1 :

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R} - \{2\}$ par $f(x) = \frac{-2x}{x-2}$. On note C la courbe représentative de f .

- 1) Calculer $f'(x)$.
- 2) Soit A le point de C d'abscisse a (a appartenant à $\mathbb{R} - \{2\}$). Déterminer le coefficient directeur de la tangente à C au point A , en fonction de a .
- 3) Existe-t-il un ou plusieurs points de C pour lequel la tangente est parallèle à la droite D d'équation $y = x$? Si oui, déterminer alors l'équation de cette ou de ces tangentes.

Exercice 2 :

On considère un carré de 24 cm de côté dans lequel on veut fabriquer une boîte. Pour ce faire, on enlève aux quatre coins un petit carré de côté x cm et on construit la boîte avec ce qui reste en repliant les rectangles des bords ainsi obtenus.



- 1) Quelles sont les valeurs possibles de x ?
- 2) Exprimer en fonction de x le volume $V(x)$ de la boîte.
- 3) On considère la fonction V définie sur $[0 ; 12]$ par :

$$V(x) = 4x^3 - 96x^2 + 576x$$
 - a) Calculer $V'(x)$
 - b) Etudier le signe de $V'(x)$ sur $[0 ; 12]$ et en déduire la tableau de variation de V sur $[0 ; 12]$.
 - c) Déterminer la valeur de x pour que le volume de la boîte soit maximal. Donner ce volume.

Exercice 3 :

On considère la fonction f définie sur \mathbb{R} par :

$$f(x) = (x-1)^2(x+1).$$

On appelle C_f sa courbe représentative

Etudier les variations de f sur \mathbb{R} .

On appelle T la tangente à C_f au point A de C_f d'abscisse $\frac{1}{3}$.

- a) Déterminer une équation de T
- b) Etudier le signe de $d(x) = f(x) - \left(-\frac{4}{3}x + \frac{28}{27}\right)$ en fonction de x . Penser à développer $\left(x - \frac{1}{3}\right)^3$
- c) En déduire la position relative de C_f par rapport à T .

Exercice 4 :


On considère la fonction f définie sur \mathbb{R} par $f(x) = x^3 - 2x^2 + x - 2$

Encadrer le plus précisément possible $f(x)$ lorsque :

- a) x appartient à $[-3 ; -1]$ b) x appartient à $[0,5 ; 2]$

Exercice 5 :

Un disque de frein peut être une pièce circulaire dans laquelle on a évidé une partie centrale comme sur le schéma donné ci-dessous :



Le contour de l'évidement entre les points A et B est modélisé par la courbe représentative \mathcal{C} de la fonction f définie sur l'intervalle $[0 ; 4]$ par :

$$f(x) = -\frac{3}{8}x^3 + \frac{5}{4}x^2 + a$$

où a est un nombre réel.

- 1) Sachant que \mathcal{C} passe par le point $A(0 ; 4)$, déterminer la valeur de a . Vérifier par le calcul que \mathcal{C} passe par le point $B(4 ; 0)$
- 2) Déterminer le maximum de f sur $[0 ; 4]$.
En déduire l'espacement maximum entre le contour de l'évidement entre A et B, et l'axe des abscisses.

Exercice 6 :

Soit (u_n) une suite définie sur \mathbb{N} par : $u_0 = 1$ et $u_{n+1} =$

$$\frac{2u_n}{2 + 3u_n}$$

1. Calculer u_1 et u_2 .
2. La suite (u_n) est-elle arithmétique ? Justifier
3. On suppose que pour tout entier naturel n , $u_n \neq 0$ et on définit la suite (v_n) par $v_n = \frac{1}{u_n}$
 - a. Montrer que la suite (v_n) est arithmétique de raison $q = \frac{3}{2}$
 - b. Donner l'expression de v_n en fonction n .
 - c. En déduire l'expression de u_n en fonction de n .
4. Etudier la monotonie de la suite (u_n) .
5. Conjecturer la limite de la suite (u_n) .

Exercice 7 :

Soit (u_n) la suite définie pour tout entier naturel n par :

$$u_0 = 0, u_1 = 1 \text{ et } u_{n+2} = 5u_{n+1} - 6u_n.$$

1. Soit (r_n) la suite définie sur \mathbb{N} par $r_n = u_{n+1} - 3u_n$.

Montrer que la suite (r_n) est géométrique et déterminer sa raison et son premier terme.

2. En déduire l'expression de r_n en fonction de n .

Exercice 8 :

Soit la suite u définie sur \mathbb{N} par : $u_0 = 10$ et pour tout entier n , $u_{n+1} = 1 + \frac{2}{u_n}$.

Soit la suite v définie pour tout entier n par :

$$v_n = \frac{u_n - 2}{u_n + 1}.$$

- 1) Calculer les quatre premiers termes de la suite v . Que peut-on conjecturer ?
- 2) Exprimer, pour tout entier n , v_{n+1} en fonction de v_n .
- 3) Donner l'expression du terme général de la suite v
- 4) En déduire l'expression du terme général de la suite u .

Exercice 9:

On définit la suite u par $u_0 = 1$ et pour tout n entier naturel, $u_{n+1} = u_n + \left(\frac{2}{3}\right)^n$

- 1) La suite u est-elle géométrique ? Justifier
- 2) Etudier les variations de la suite u .
- 3) On pose, pour tout n appartenant à \mathbb{N} , $v_n = u_{n+1} - u_n$. Démontrer que la suite v est géométrique de raison $\frac{2}{3}$.
- 4) Calculer $S_n = v_0 + v_1 + v_2 + \dots + v_n$ en fonction de n
- 5) En déduire l'expression de u_{n+1} puis de u_n en fonction de n .

Exercice 10:

Une subvention de 116 610 € est octroyée pour la recherche d'une nappe souterraine repérée par un spécialiste dans un désert.

Une entreprise donne l'estimation du coût de forage: le forage du 1er mètre coûte 130€; le forage du deuxième mètre coûte 52€ de plus que celui du premier mètre; le forage du troisième mètre coûte 52€ de plus que celui du deuxième mètre...

Plus généralement le forage de chaque mètre supplémentaire coûte 52€ de plus que celui du mètre précédent.

Pour tout entier $n \geq 1$, on note:

- u_n le coût du forage du n -ième mètre en euros;
- S_n le coût de forage de n mètres en euros.

- 1) Préciser la nature de la suite u . En déduire l'expression de u_n en fonction de n .
- 2) Démontrer que pour tout entier $n \geq 1$,
 $S_n = 26n^2 + 104n$

- 3) Quelle profondeur maximale, en mètres, peut-on forer avec la subvention allouée? Justifier soigneusement.

Exercice 11: (Lille juin 2013)

Une jardinerie vend de jeunes plants d'arbres qui proviennent de trois horticulteurs : 35% des plants proviennent de l'horticulteur H_1 , 25% de l'horticulteur H_2 et le reste de l'horticulteur H_3 .

Chaque horticulteur livre deux catégories d'arbres : des conifères et des arbres à feuilles.

La livraison de l'horticulteur H_1 comporte 80% de conifère alors que celle de l'horticulteur H_2 n'en comporte que 50% et celle de l'horticulteur H_3 seulement 30%.

1) Le gérant de la jardinerie choisit un arbre au hasard dans son stock.

On envisage les évènements suivants :

- H_1 : « l'arbre choisi a été acheté chez l'horticulteur H_1 »,
- H_2 : « l'arbre choisi a été acheté chez l'horticulteur H_2 »,
- H_3 : « l'arbre choisi a été acheté chez l'horticulteur H_3 »,
- C : « l'arbre choisi est un conifère »,
- F : « l'arbre choisi est un arbre feuillu ».

a) Construire un arbre pondéré traduisant la situation.

b) Calculer la probabilité que l'arbre choisi soit un conifère acheté chez l'horticulteur H_3 »,

c) Justifier que la probabilité de l'évènement C est égale à 0,525.

2) on choisit au hasard un échantillon de 10 arbres dans le stock de cette jardinerie. On suppose que ce stock est suffisamment important pour que ce choix puisse être assimilé à un tirage avec remise de 10 arbres dans le stock.

On appelle X la variable aléatoire qui donne le nombre de conifères de l'échantillon choisi.

a) Justifier que X suit une loi binomiale dont on précisera les paramètres.

b) Quelle est la probabilité que l'échantillon prélevé comporte exactement 5 conifères ? On arrondira à 10^{-3} .

c) Quelle est la probabilité que cet échantillon prélevé comporte au moins deux arbres feuillus ? On arrondira à 10^{-3} .

Exercice 12:

Dans un repère orthonormé $(O, \text{Erreur !, Erreur !})$ d'unité graphique 1 cm, on donne les points $A(-1 ; 2)$,

$B(1 ; 3)$ et $C(3 ; -1)$. Placer les points sur une figure.

1) Démontrer que le triangle ABC est rectangle.

2) Déterminer une équation de son cercle circonscrit \mathcal{C} . Préciser les coordonnées de son centre K et son rayon.

3) Déterminer une équation de la tangente à \mathcal{C} en A .

4) Soit H le projeté orthogonal de B sur la droite (AC) . Sans chercher à déterminer les coordonnées du point H dans $(O, \text{Erreur !, Erreur !})$, établir les relations :

$$\text{Erreur ! .Erreur !} = \text{Erreur !}^2 = AH \times AC.$$

En déduire que $AH = 1$ et $HK = 1,5$.

5) Déterminer la nature de l'ensemble (E) des points M du plan qui vérifient $\text{Erreur ! .Erreur !} = 5$.

Représenter (E) sur la figure.